

**TITLE: STOOL SAMPLE COLLECTION - SPANISH****LEA PRIMERO ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE TOMAR LA MUESTRA:**

- Levante el asiento del inodoro y cubra con plástico la taza del baño
- Asegúrese de que la muestra no se mezcle con orina para evitar contaminación
- Con la ayuda de una cucharita desechable o de un palito de paleta, tome la muestra y colóquela en el recipiente. Asegúrese de cerrar muy bien el recipiente.
- Escriba en todos los recipientes su: NOMBRE; FECHA DE NACIMIENTO; FECHA Y HORA DE LA TOMA DE LA MUESTRA.
- Coloque los recipientes con las muestras, en una bolsa de plástico y llévelos al laboratorio.

**INSTRUCCIONES PARA TOMAR MUESTRAS DE HECES FETALES**

<b>NOMBRE DE LA PRUEBA</b>	<b>TIPO DE RECIPIENTE</b>	<b>MUESTRA DE HECES</b>	<b>INSTRUCCIONES</b>	<b>TIEMPO DE PROCESO</b>
Clostridium Difficile	Esterilizado	Colocar unas cuantas cucharaditas de <b>heces líquidas</b> en el recipiente.	Refrigere la muestra.	Llevar la muestra al laboratorio dentro de 24 horas.
Electrolitos (Na+, K+)	Limpio / No esterilizado	Solo muestras de <b>heces líquidas</b> .	Congelar la muestra inmediatamente después de tomarla	Una muestra de heces congeladas, es estable por 3 meses.
Calprotectina Fecal	Esterilizado	Muestra de heces solidas	Congelar la muestra inmediatamente después de tomarla	Una muestra de heces congeladas, es estable por 28 días.
Lactoferrina Fecal	Esterilizado	Colocar solo unas cuantas cucharaditas de heces en el recipiente.	Utilice una cucharita desechable para tomar la muestra.	Estable a temperatura ambiente y refrigerada por 14 días

**TITLE: STOOL SAMPLE COLLECTION - SPANISH**

Norovirus	Esterilizado	Colocar unas cuantas cucharaditas de heces en el recipiente.	Refrigerar la muestra	Llevar la muestra al laboratorio dentro de 24 horas.
Osmolaridad	Limpio / No esterilizado	Muestra de heces líquidas.	Congelar la muestra y llevarla al laboratorio en hielo.	Lleve la muestra congelada al laboratorio dentro de 48 horas.
Grasa Fecal Cualitativo	Limpio / No esterilizado	Muestra de heces sólidas.	Congelar la muestra inmediatamente después de tomarla	La muestra congelada es estable hasta por 30 días.
Grasa Fecal Cuantitativo	Especial, lo obtiene en el laboratorio. Colección de muestras total de (24, 48 o 72 horas). El paciente debe seguir una dieta que incluya 100 gramos de grasa al día por 3 días antes de tomar las muestras y durante el periodo de colección de muestras.	Congelar la muestra de heces en el recipiente especial que le dieron. Marcar la fecha de inicio y fecha final de colección de muestras en el recipiente.	Mantener el recipiente con la muestra en el refrigerador durante el tiempo de colección.	Congelar las muestras después de tomar la última muestra. Una muestra de heces congelada, es estable por 28 días.
Sustancias Reductoras	Recipientes de plástico hermético. (No fugas)	Muestra de heces	Congelar la muestra inmediatamente después de tomarla	La muestra congelada es estable hasta por 60 días.
Rotavirus	Limpio / No esterilizado	Muestra de solo unas cucharaditas de heces.	Coloque la muestra en el refrigerador, meta el recipiente en hielo y llévelo al laboratorio	Coloque el recipiente con la muestra dentro de otro recipiente con hielo y llévelo al laboratorio dentro de 24 horas.

**TITLE: STOOL SAMPLE COLLECTION - SPANISH**

Panel de parásitos	Total-Fix® (Tapa negra)	Llenar hasta la línea	Utilizando la cucharita/tenedor incluido, tome una muestra de los extremos, de en medio y de cualquier parte que se vea con sangre o moco. Coloque lo suficiente en el recipiente hasta que el líquido suba hasta la línea roja. Cierre bien el recipiente y después agite muy bien hasta que todo quede perfectamente mezclado. Conserve el recipiente con la muestra a temperatura ambiente.	Lleve la muestra al laboratorio dentro de 24 horas.
Panel PCR de patógenos entéricos	Cary Blair (Tapa amarilla)	Llenar hasta la línea	Utilizando la cucharita/tenedor incluido, tome una muestra de los extremos, de en medio y de cualquier parte que se vean con sangre o moco. Coloque lo suficiente en el recipiente hasta que el líquido suba hasta la línea roja. Cierre perfectamente y agite muy bien hasta que todo quede perfectamente mezclado. Conserve el recipiente con la muestra a temperatura ambiente.	Lleve la muestra al laboratorio dentro de 24 horas.
Detección de antígenos de Helicobacter Pylori	Esterilizado	Tomar una muestra de solo unas cucharaditas de heces en el recipiente.	Mantener la muestra a temperatura ambiente o refrigerada	A temperatura ambiente o refrigerada por 96 horas o congelada por 14 días.